

EXPAND TPT
TB REACH-BRAZIL



Perguntas

1. Qual a diferença entre tuberculose doença e tuberculose infecção?
2. Como sei se a pessoa tem a infecção ou a doença?
3. A pessoa com infecção pode adoecer?
4. Existe prevenção do adoecimento?



EXPAND TPT
TB REACH-BRAZIL

Principal objetivo

- Expandir o tratamento preventivo com 3HP em contatos

O que é contato?

*Alguém que, nos 3 meses anteriores, dormiu na mesma casa por pelo menos **uma noite** ou passou mais **de 5 horas** por semana no mesmo ambiente que um pessoa com tuberculose*



Quem mais transmite tuberculose?

- Pessoas com tuberculose LARÍNGEA
- Pessoas com tuberculose PULMONAR confirmada bacteriologicamente por qualquer exame (BAAR, TRM, cultura)
- Pessoas com tuberculose PULMONAR com diagnóstico clínico-radiológico com tosse produtiva



E porque é importante identificar e examinar os contatos?



**Porque eles
podem ter se
infectado ou até
adoecido**

-


Quem se infectou e não adoeceu ainda, tem
alto risco de adoecer. É isso que queremos
evitar!

Qual a diferença entre tuberculose doença e infecção latente?

A doença



A infecção



O que é infecção latente (ILTB ou TBI)?



Com TB ativa

0%




há <2 anos
idade

Quais os sintomas da tuberculose doença e da infecção latente?


Sintomas da doença

- Tosse (seca ou produtiva)
- Escarro com sangue
- Febre, sudorese
- Emagrecimento



Sintomas da infecção


Nenhum!!!!



Como sei se é tuberculose doença ou infecção latente?


Diagnóstico da doença

- Teste rápido
- Baciloscopia



Diagnóstico da infecção

- PPD (prova tuberculínica)
- Em crianças e PVHA, IGRA






É a doença infecciosa que
mais mata (mais que covid)

Deixa sequelas, no pulmão
e fora dele


Por isso, queremos EVITAR!



Porque é importante
trazer os contatos
para a unidade de
saúde?



Para aumentar o número de contatos que completam o tratamento!



Porque é importante trazer os contatos para a unidade de saúde?

-

Porque é a forma mais eficaz de aumentar o número dos que completam o tratamento!!!!

Etapa 1: Identificando Contatos Intradomiciliares



Dicas para identificar contatos – 1



Tempo e privacidade são importantes!

para explicar a importância da avaliação de contatos

para descobrir quem visitou/ ficou na casa do paciente nos últimos 3 meses

para que o paciente se sinta confortável e sem pressa



Informar que contatos < 5 anos e PVHA são prioridade

Dicas para identificar contatos - 2

Perguntas para ajudar a identificar os contatos intradomiciliares:

- Quem mora com você?
- Quem mais dorme lá? Com que frequência e por quanto tempo?
- Quem faz refeições na sua casa? Com qual frequência?
- Quem mais passa tempo em sua casa? Com que frequência e por quanto tempo eles geralmente ficam?
- Você dorme em/come em/visita uma casa diferente regularmente? (as pessoas podem ter mais de uma casa, ou visitam outra casa regularmente: avós, parentes, etc)

Dicas para identificar contatos - 3

OUTROS CONTATOS PRÓXIMOS, FORA DO DOMICÍLIO!!!

Mais perguntas:

Nos últimos 3 meses:

- Quais outros membros da família ou amigos ficaram durante a noite em sua casa?
- Quais crianças menores de 5 anos ficaram durante a noite ou passaram períodos de tempo durante o dia/noite em sua casa?
- Onde mais você dormiu? Quanto tempo você ficou? Quem mais estava lá?

**Etapas 2 e 3:
O que vai
acontecer com o
contato na
unidade?**



Iniciar sempre perguntando por sintomas, idade, HIV

- Agendar consulta médica se
 - Presença de sintomas
 - PVHA
 - Crianças < 10 anos
- Porque são prioridade?



Na primeira visita à unidade: prova tuberculínica (“PPD”) ou IGRA



PPD para a maioria



Para crianças e imunodeprimidos, está disponível IGRA

Além do PPD ou IGRA, nos sintomáticos



teste rápido molecular, TRM, GexeXpert, Xpert



Rx tórax

Tudo isso na 1ª visita



- Pergunta se tem sintoma
- Garante aplicação do PPD
- Se PVHA ou <10 anos, radiografia
- Se sintomas: coleta escarro e radiografia
- Agendar médico se PVHA, < 10 anos, sintomas ou PPD+

Etapa 3: Afastando TB doença




Se PPD ou
IGRA+, Rx de
tórax para
afastar TB
doença.
Se Rx normal:
inicia
tratamento



Inicia ainda na 2a visita o tratamento preventivo

3HP

- 6 comp. rifapentina 150 mg
- 3 comp INH 300 mg



Principais efeitos adversos

Rifapentina

- Alergias +++++
 - Inclusive com hipotensão, edema de Quincke (olhos e lábios inchados, falta de ar por inchaço da laringe)
- Enjoo ou diarreia
- Não usar em crianças de menos de 2 anos e em grávidas até que apareçam novos estudos nestas populações

INH: Lesão no fígado (vômitos, icterícia)

Resumindo: idealmente, 2 visitas à unidade

1a visita

- Perguntar por sintomas
- PPD (ou IGRA)



2a visita


- Ler PPD (ou receber resultado IGRA)
- Fazer Rx tórax se PPD/QFT +
- Iniciar tratamento se Rx tórax normal
- Alta se PPD- sem sintomas





O que precisamos de vocês

- Identificar os contatos
- Convencê-los de que estão sob risco de adoecer mas que podem evitar o adoecimento
- Agendar PPD **para 1ª consulta na unidade**
- Acompanhar para ver se aderiram ou se têm efeitos adversos.



atrajman@gmail.com

Obrigada!

Debate:
Que dificuldades existem?
Como podemos ajudar vocês?

