

O remédio pode me causar algum problema?

O remédio costuma ser muito bem tolerado, em geral não há nenhum efeito indesejado. Algumas pessoas podem às vezes ter coceiras ou mais raramente enjojo. Neste caso, volte na unidade de saúde, o enfermeiro ou o médico vão te ajudar.



Crianças também devem tomar o remédio?

As crianças têm risco ainda maior de adoecer, principalmente os pequenos. Traga-os para a clínica, faremos os mesmos exames e daremos o melhor tratamento!



ORIENTAÇÕES PARA QUEM TEM OU TEVE CONTATO COM PESSOAS COM TUBERCULOSE



Você está recebendo este material porque esteve em contato próximo com alguém que tem tuberculose. Vamos dar algumas explicações e conselhos sobre este contato.



MINISTÉRIO DA SAÚDE



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Que risco eu corro?

A tuberculose é transmitida quando uma pessoa com tuberculose nos pulmões fala, tosse, canta ou espirra perto de outras pessoas.

Quem se contamina com o bacilo da tuberculose em geral não sente nada por muitos meses, mas pode adoecer no futuro.

Por isso, é possível que você tenha a infecção com o bacilo da tuberculose, mesmo não se sentindo doente.

A tuberculose é uma doença que tem prevenção, tratamento e cura. Mas você pode evitar as suas consequências graves. O tratamento preventivo é bem mais curto que o tratamento da doença.



Como sei se estou infectado?

Existem exames que podem identificar se você contraiu o bacilo da tuberculose, mesmo não sentindo nada. De uma forma geral, é feito um teste conhecido como PPD: uma injeção com uma agulha bem fininha na pele, e dois dias depois um enfermeiro mede a reação na pele. Se você não se infectou, pode fazer novo exame em 8 semanas ou simplesmente ter alta.



O que acontece quando a pessoa é infectada?

Você tem a infecção latente, mas existe um tratamento para evitar que esta infecção vire doença (tuberculose ativa ou tuberculose doença). Evitar que você adoça é importante porque a tuberculose pode causar problemas futuros, e porque você poderá também transmitir a doença para outras pessoas.

Neste caso, antes de dar o tratamento, o enfermeiro ou médico vai solicitar que você faça uma radiografia (chapa ou raio-X dos pulmões) para ter certeza de que você não está doente, mesmo sem sintomas. Você deve procurar a unidade mais próxima da sua casa.



Com a chapa normal, você sairá do consultório já com a receita da medicação, que será provavelmente um tratamento de 12 doses, uma por semana, ou seja em 3 meses, o tratamento está concluído.



Esse tratamento diminui demais a chance de você ter tuberculose, vale muito a pena! Existem outros tratamentos que podem ser mais adequados, seu médico vai decidir junto com você qual é o melhor. O tratamento e o acompanhamento são gratuitos, pelo SUS.